

Conozca los pasos:

El A, B, C de una inyección con éxito

**epinephrine injection, USP
auto-injector**


Available as

0.15 mg

0.3 mg


PASO A

- Retire del extremo la tapa **GRIS** con el número [1]; verá entonces una punta **ROJA**. Nunca coloque el pulgar, un dedo o la mano sobre la punta **ROJA**.
- Retire del extremo la tapa **GRIS** con el número [2].



PASO B

- Coloque la punta **ROJA** sobre la zona central externa de su muslo según se ilustra.
- Presione hacia abajo con fuerza y mantenga en el lugar mientras cuenta hasta 10 lentamente.



PASO C

- Llame al **911**. Procure atención médica de inmediato.



Indicación

- El autoinyector de epinefrina es una inyección de emergencia de epinefrina. Es un medicamento que se usa para reacciones alérgicas que ponen en riesgo la vida, tales como inflamación grave, problemas respiratorios o pérdida de presión arterial. Las reacciones alérgicas pueden ser causadas por picaduras y mordeduras de insectos, alergia a las inyecciones, alimentos, medicamentos, ejercicio o causas desconocidas.
- Después de usar el autoinyector de epinefrina acuda a su médico o a una sala de emergencia de inmediato para recibir más tratamiento médico.

Información importante de seguridad (vea también al dorso)

- Un exceso de epinefrina (autoinyector de epinefrina) puede causar presión arterial peligrosamente alta, un accidente cerebrovascular o la muerte.
- Si toma determinados medicamentos, puede sufrir efectos secundarios graves que ponen en riesgo la vida a causa de la epinefrina contenida en el autoinyector de epinefrina. Asegúrese de informarle a su médico acerca de todas sus afecciones médicas y alergias.

La epinefrina puede causar las siguientes reacciones:

- ♦ latidos cardíacos más rápidos, irregulares (fuera de ritmo) o palpitaciones
- ♦ dolor de cabeza pulsátil
- ♦ palidez
- ♦ sentimientos de sobreexcitación, ansiedad o miedo
- ♦ debilidad o temblores
- ♦ mareos
- ♦ náuseas y vómitos
- ♦ sudoración

- Algunas reacciones pueden ser graves. Normalmente desaparecen con el reposo.
- Estos no son los únicos efectos secundarios posibles del autoinyector de epinefrina. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Le alentamos a informar de los efectos secundarios de fármacos de venta con receta a la FDA visitando www.FDA.gov/medwatch o llamando al 1-800-FDA-1088. Pídale a su proveedor de atención médica más información sobre el AUTOINYECTOR DE EPINEFRINA de Lineage Therapeutics y la anafilaxia.

La inyección de epinefrina, USP autoinyector, es un medicamento genérico autorizado de AdrenaClick® (inyección de epinefrina, USP), una marca comercial registrada de Amedra Pharmaceuticals LLC.

Vea en el prospecto adjunto la información completa de prescripción, disponible en www.epinephrineautoinject.com.

Para conocer más acerca del autoinyector de epinefrina, visite www.epinephrineautoinject.com

 lineage therapeutics

OCTOBER2013049. © 2013.
Lineage Therapeutics.
Todos los derechos reservados.

Indicación

- El auto-inyector de epinefrina es una inyección de emergencia de epinefrina. Es un medicamento que se usa para reacciones alérgicas que ponen en riesgo la vida, tales como inflamación grave, problemas respiratorios o pérdida de presión arterial. Las reacciones alérgicas pueden ser causadas por picaduras y mordeduras de insectos, alergia a las inyecciones, alimentos, medicamentos, ejercicio o causas desconocidas.
- Después de usar el autoinyector de epinefrina acuda a su médico o a una sala de emergencia de inmediato para recibir más tratamiento médico.

Información importante de seguridad

- Asegúrese de informar a su médico acerca de todas sus afecciones médicas y alergias, especialmente si:
 - ♦ tiene una enfermedad cardíaca o presión arterial alta
 - ♦ tiene diabetes
 - ♦ tiene afecciones tiroideas
 - ♦ tiene asma
 - ♦ tiene depresión u otra enfermedad mental
 - ♦ tiene enfermedad de Parkinson
 - ♦ está embarazada
 - ♦ es alérgico/a a alguno de los ingredientes del autoinyector de epinefrina
- Informe a su médico de todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con receta y los de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios graves si los toma mientras usa el autoinyector de epinefrina. Algunos medicamentos pueden afectar la manera en que actúa el autoinyector de epinefrina, o el autoinyector de epinefrina puede afectar la manera en que sus otros medicamentos actúan.
- Los pacientes diabéticos pueden necesitar ajustar la dosis de sus medicamentos para la diabetes o la insulina después de usar el autoinyector de epinefrina.
- Evite inyectarse el autoinyector de epinefrina en los glúteos o cualquier otra parte del cuerpo que no sea la zona central externa del muslo (la parte superior de la pierna). Evite inyectarse el autoinyector de epinefrina en una vena.
- Un exceso de epinefrina puede causar presión arterial peligrosamente alta, un accidente cerebrovascular o la muerte. Si toma determinados medicamentos, puede sufrir efectos secundarios graves que ponen en riesgo la vida a causa de la epinefrina contenida en el autoinyector de epinefrina. Asegúrese

de informar a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, especialmente para el asma.

- Los pacientes con determinadas afecciones médicas, o que toman ciertos medicamentos, pueden sufrir más efectos secundarios causados por el autoinyector de epinefrina, o los efectos secundarios pueden durar más. Esto incluye a los pacientes que toman ciertos tipos de medicamentos para el asma, las alergias, la depresión, el hipertiroidismo, la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas. Los pacientes con enfermedades cardíacas pueden sentir dolor de pecho (angina). A los pacientes con enfermedades mentales o enfermedad de Parkinson se les pueden agravar los síntomas de sus enfermedades. La epinefrina puede causar las siguientes reacciones:
 - ♦ latidos cardíacos más rápidos, irregulares (fuera de ritmo) o palpitaciones
 - ♦ dolor de cabeza pulsátil
 - ♦ palidez
 - ♦ sentimientos de sobreexcitación, ansiedad o miedo
 - ♦ debilidad o temblores
 - ♦ mareos
 - ♦ náuseas y vómitos
 - ♦ sudoración
- Algunas reacciones pueden ser graves. Normalmente desaparecen con el reposo.
- Estos no son los únicos efectos secundarios posibles del autoinyector de epinefrina. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.
- Le alentamos a que informe de efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

DESPUÉS DEL USO/DESECHO

- El líquido remanente que queda después de esta dosis fija no puede volver a usarse y debe ser desechado.
- Coloque el autoinyector, con la aguja hacia adelante, en el estuche de transporte.
- Coloque la parte gris claro del estuche sobre el extremo del autoinyector que no tiene aguja y cierre el estuche.
- Entréguele el autoinyector de epinefrina usado a un trabajador de la salud para que lo deseche apropiadamente. NO lo arroje en un contenedor de desechos regular.